

Parofor®

140 mg/ml OS



**Νέα εγγυημένη μορφή
διαλύματος έναντι των
γαστρεντερικών λοιμώξεων που
προκαλούνται από τα στελέχη
της E. Coli**



Η παρομομυκίνη πρώτη φορά απομονώθηκε από καλλιέργεια του μικροοργανισμού *Streptomyces chrestomyceticus* και αρχικά ονομάστηκε «αμινοσιδίνη». Η παρομομυκίνη ανήκει στην κατηγορία των αμινογλυκοσίδων με ευρύ φάσμα δράσης, δηλαδή είναι δραστική έναντι διάφορων Gram- θετικών βακτηρίων καθώς και έναντι πολλών Gram- αρνητικών.



Θεραπευτική Ένδειξη:

E.coli

Δοσολογία:

0,125 - 0,25 ml προϊόντος ανά kg σωματικού βάρους

Διάρκεια Θεραπείας:

3 - 5 ημέρες

Χρόνος Αναμονής:

20 ημέρες

**Διαθέσιμο σε
χρηστικά μπουκάλια:**

125ml, 250ml,
500ml, 1000ml

Αντενδείξεις

Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στην παρομομυκίνη, σε άλλες αμινογλυκοσίδες ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα.

Να μη χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις με νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια.

Να μη χρησιμοποιείται σε μηρυκάζοντα ζώα.

Να μη χρησιμοποιείται σε ινδόνριθες (γαλοπούλες) λόγω του κινδύνου επιλογής αντιμικροβιακής αντοχής σε εντερικά βακτήρια.

HUVEPHARMA N.V. • UITBREIDINGSTRAAT 80 • 2600 ANTWERP • BELGIUM
P+32 3 288 1849 • F+32 3 289 7845
CUSTOMERSERVICE@HUVEPHARMA.COM

HUVEPHARMA EOOD • 3A NIKOLAY HAYTOV STR. • 1113 SOFIA • BULGARIA
P +359 2 862 5331 • F+359 2 862 5334
SALES@HUVEPHARMA.COM





Σύνθεση

1 ml Parofor[®] 140 mg / ml OS περιέχει 200 mg θειικής παραμομικίνης, ισοδύναμο με την βάση της παραμομικίνης 140 mg ή 140.000 IU της δραστηριότητας της παραμομικίνης.

Φαρμακευτική μορφή

Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό, γάλα ή υποκατάστατο γάλακτος.

Είδος ζώου για χρήση

Προ-μηρυκαστικά βοοειδή και χοίρους.

Θεραπευτικές ενδείξεις

Θεραπεία γαστρεντερικών λοιμώξεων που προκαλούνται από στελέχη της *Escherichia coli* ευαίσθητα στην παραμομικίνη.

Οδηγίες κατά τη χρήση

Προ-μηρυκαστικά βοοειδή: 225-50mg θειικής παραμομικίνης / kg σ.β./ημέρα (ισοδύναμο με 0,125-0,25ml προϊόντος / kg σ.β./ημέρα).

Χοίροι: 25-40 mg θειικής παραμομικίνης/ kg σ.β./ημέρα (ισοδύναμο με 0,125-0,2ml προϊόντος / kg σ.β./ημέρα).

Για να εξασφαλίσετε ακριβή μέτρηση της απαιτούμενης ποσότητας του προϊόντος, πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος βαθμονομημένος εξοπλισμός μέτρησης.

Διάρκεια θεραπείας

3-5 ημέρες. Χορήγηση από το στόμα.

Χρόνος(οι) αναμονής

Προ-μηρυκαστικά βοοειδή
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 20 ημέρες

Χοίροι
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 3 ημέρες

Υπερδοσολογία

Η παραμομικίνη όταν χορηγείται από το στόμα δύσκολα απορροφάται συστηματικά. Επιβλαβείς επιδράσεις λόγω τυχαίας υπερδοσολογίας είναι εξαιρετικά απίθανες.

Διάρκεια ζωής

- Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης: 2 έτη.
- Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 3 μήνες.
- Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σε πόσιμο νερό: 24 ώρες.
- Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σε γάλα/ υποκατάστατο γάλακτος: 6 ώρες.

Αποθήκευση

Προϊόν συσκευασμένο προς πώληση: να μη φυλάσσετε πάνω από 25 ° C.
Μετά το πρώτο άνοιγμα: να μην φυλάσσετε πάνω από 25 ° C.
Μετά την ανασύσταση: δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί στις συνθήκες αποθήκευσης.

Ασυμβατότητες

Σε περίπτωση έλλειψης μελετών συμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Συσκευασία

Λευκή φιάλη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας με βιδωτό πώμα από πολυπροπυλένιο 125 ml, 250 ml, 500 ml και 1 L. Μπορεί να μην διατίθενται όλες οι συσκευασίες στο εμπόριο.