

Θεραπευτική Ένδειξη

E.coli

Δοσολογία:

0,125 - 0,2 ml προϊόντος ανά kg σωματικού βάρους

Διάρκεια Θεραπείας:

3 - 5 ημέρες

Χρόνος Αναμονής:

3 ημέρες

Διαθέσιμο σε χρηστικά μπουκάλια:

125ml, 250ml

Αντενδείξεις

Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με γνωστή υπερευαισθησία στην παρομομικίνη, σε άλλες αμινογλυκοσίδες ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα.

Να μη χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις με νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια.

Να μη χρησιμοποιείται σε μηρυκάζοντα ζώα.

Να μη χρησιμοποιείται σε ινδόνριδες (γαλοπούλες) λόγω του κινδύνου επιλογής αντιμικροβιακής αντοχής σε εντερικά βακτήρια.

Η παρομομικίνη πρώτη φορά απομονώθηκε από καλλιέργεια του μικροοργανισμού *Streptomyces chrestomyceticus* και αρχικά ονομάστηκε «αμινοσιδίνη». Η παρομομικίνη ανήκει στην κατηγορία των αμινογλυκοσίδων με ευρύ φάσμα δράσης, δηλαδή είναι δραστική έναντι διάφορων Gram-θετικών βακτηρίων καθώς και έναντι πολλών Gram-αρνητικών. Δίπλα στην αντιβακτηριακή του δραστικότητα, το μόριο επίσης συγκέντρωσε ευρέως τη προσοχή για τις αντιπρωτοζωικές του ιδιότητες. (Alejandro Grinberg, 2002; E.H. Johnson, 2000; Viu et al.; 2000; Grinberg et al., 2002)



Parofofor®

140 mg/ml OS



Αποτελεσματική θεραπεία έναντι των γαστρεντερικών λοιμώξεων που προκαλούνται από τα στελέχη της *E. Coli*



HUVEPHARMA N.V. • UITBREIDINGSTRAAT 80 • 2600 ANTWERP • BELGIUM
P+32 3 288 1849 • F+32 3 289 7845
CUSTOMERSERVICE@HUVEPHARMA.COM

HUVEPHARMA EOOD • 3A NIKOLAY HAYTOV STR. • 1113 SOFIA • BULGARIA
P +359 2 862 5331 • F+359 2 862 5334
SALES@HUVEPHARMA.COM



Parofofor[®] 140 mg/ml OS

Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό, γάλα ή υποκατάστατο γάλακτος για προ-μηρυκαστικά βοοειδή και χοίρους.



Σύνθεση

1 ml Parofofor[®] 140 mg / ml OS περιέχει 200 mg θειικής παραμομυκίνης, ισοδύναμο με την βάση της παραμομυκίνης 140 mg ή 140.000 IU της δραστηριότητας της παραμομυκίνης.

Φαρμακευτική μορφή

Διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό, γάλα ή υποκατάστατο γάλακτος.

Είδος ζώου για χρήση

Προ-μηρυκαστικά βοοειδή και χοίρους.

Θεραπευτικές ενδείξεις

Θεραπεία γαστρεντερικών λοιμώξεων που προκαλούνται από στελέχη της *Escherichia coli* ευαίσθητα στην παραμομυκίνη.

Οδηγίες κατά τη χρήση

Χοίροι: 25-40 mg θειικής παραμομυκίνης/ kg σ.β./ημέρα (ισοδύναμο με 0,125-0,2ml προϊόντος / kg σ.β./ημέρα).

Προ-μηρυκαστικά βοοειδή: 225-50mg θειικής παραμομυκίνης / kg σ.β./ημέρα (ισοδύναμο με 0,125-0,25ml προϊόντος / kg σ.β./ημέρα).

Διάρκεια θεραπείας

3-5 ημέρες. Χορήγηση από το στόμα.

Χρόνος(οι) αναμονής

Προ-μηρυκαστικά βοοειδή
Κρέας και εδώδιμο ιστοί: 20 ημέρες

Χοίροι
Κρέας και εδώδιμο ιστοί: 3 ημέρες

Υπερδοσολογία

Η παραμομυκίνη όταν χορηγείται από το στόμα δύσκολα απορροφάται συστηματικά. Επιβλαβείς επιδράσεις λόγω τυχαίας υπερδοσολογίας είναι εξαιρετικά απίθανες.

Διάρκεια ζωής

- Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης: 2 έτη.
- Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 3 μήνες.
- Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σε πόσιμο νερό: 24 ώρες.
- Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σε γάλα/ υποκατάστατο γάλακτος: 6 ώρες.

Αποθήκευση

Προϊόν συσκευασμένο προς πώληση: να μη φυλάσσεται πάνω από 25 ° C.
Μετά το πρώτο άνοιγμα: να μην φυλάσσεται πάνω από 25 ° C.
Μετά την ανασύσταση: δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί στις συνθήκες αποθήκευσης.

Ασυμβατότητες

Σε περίπτωση έλλειψης μελετών συμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Συσκευασία

Λευκή φιάλη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας με βιδωτό πώμα από πολυπροπυλένιο 125 ml, 250 ml, 500 ml και 1 L. Μπορεί να μην διατίθενται όλες οι συσκευασίες στο εμπόριο.