




Pharmasin® 100 & 250 MG/G PREMIX

TYLOSIN PHOSPHATE



Ενδείξεις:

Χοίροι

Το Pharmasin σε μορφή φαρμακούχου προμίγματος τροφής ενδείκνυται για τη θεραπεία και πρόληψη της Εντερικής Αδενωμάτωσης των Χοίρων (PIA) που οφείλεται στη *Lawsonia intracellularis* όταν η ασθένεια έχει διαγνωσθεί στο κοπάδι.

Ορνίθια κρεοπαραγωγής και πουλάδες

Το Pharmasin σε μορφή φαρμακούχου προμίγματος τροφής ενδείκνυται για τη θεραπεία και πρόληψη αναπνευστικών μολύνσεων που οφείλονται σε *Mycoplasma gallisepticum* και *Mycoplasma synoviae* και στη νεκρωτική εντερίτιδα που προκαλείται από το *Clostridium perfringens*, όταν οι ασθένειες αυτές έχουν διαγνωσθεί στο σμήνος.

Χρόνος αναμονής

Κρέας και εντόσθια

- Χοίροι: 0 ημέρα
- Ορνίθια κρεοπαραγωγής και πουλάδες: 1 ημέρα

Να μην χρησιμοποιείται σε όρνιθες αυγοπαραγωγής που παράγουν αυγά για ανθρώπινη κατανάλωση.

Διάρκεια ζωής του προϊόντος

- Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού προϊόντος σε συσκευασία πώλησης: 2 χρόνια
- Διάρκεια ζωής μετά από ανάμιξη στο γέυμα ή στην πελετοποιημένη τροφή: 3 μήνες
- Η αρχική συσκευασία να αποθηκεύεται σε ξηρό μέρος και σε θερμοκρασίες κάτω των 30ο C και να αποφεύγεται η απευθείας επαφή με το ηλιακό φως. Το προϊόν να μην ψύχεται ή να καταψύχεται.

	Συγκέντρωση	Ασθένεια	Προτεινόμενη δόση		Περίοδο θεραπείας/ διάρκεια
			Τυλοζίνη/kg ΣΒ	Pharmasin μM / kg ΣΒ	
Χοίροι	100 mg/g	Εντερική Αδενωμάτωση Χοίρων (PIA)	4-5 mg	40-50 mg	3 εβδομάδες
	250 mg/g	Εντερική Αδενωμάτωση Χοίρων (PIA)	4-5 mg	16-20 mg	3 εβδομάδες
Ορνίθια κρεοπαραγωγής/ πουλάδες	100 mg/g	Αναπνευστική μόλυνση Νεκρωτική εντερίτιδα	127 mg 10-20 mg	1270 mg 100-200 mg	Πρώτες 5 ημέρες, επανάληψη στις 3-4 εβδ. ηλικίας 7 ημέρες
	250 mg/g	Αναπνευστική μόλυνση Νεκρωτική εντερίτιδα	127 mg 10-20 mg	508 mg 40-80 mg	Πρώτες 5 ημέρες, επανάληψη στις 3-4 εβδ. ηλικίας 7 ημέρες

