

Pharmasin® 200 mg/ml

ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, πρόβατα,
αίγες και χοίρους

50 ml

Δραστικό συστατικό:

Τυλοσίνη 200.000 IU/ml

Έκδοχα:

Βενζυλική αλκοόλη (E1519) 40 mg/ml.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:

Βοοειδή: 28 ημέρες,

Αιγοπρόβατα: 42 ημέρες

Χοίροι: 14 ημέρες

Γάλα: 108 ώρες

ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 60163/29-7-13

Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης, πριν από τη χρήση. Για ενδομυϊκή ή ενδοφλέβια (μόνο σε βοοειδή) χρήση. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης, πριν από τη χρήση. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσεως, πριν από τη χρήση. Προστατέψτε από το φως. Φυλάσσετε στον αρχικό περιέκτη. Να μην φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C. Να μην καταψύχεται. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης. Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση. Να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή. Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Αφού ανοιχθεί, να χρησιμοποιείται εντός 28 ημερών. Απορρίψτε τυχόν ποσότητα του προϊόντος που παραμένει στον περιέκτη μετά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Μετά το πρώτο άνοιγμα, χρήση έως...

ΛΗΞΗ:

Παρτίδα



HUVEPHARMA

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Huvepharma NV
Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerpen
Βέλγιο



ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

ΒΟΟΕΙΔΗ • ΠΡΟΒΑΤΑ • ΑΙΓΕΣ • ΧΟΙΡΟΙ