

Vetmulin[®] 162 mg/ml

100 ml

Ενέσιμο διάλυμα για χοίρους
Tiamulin

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

Ενεργό συστατικό: Tiamulin 162 mg/ml

Έκδοχα

Butyl parahydroxybenzoate 0,324 mg/ml

Propyl gallate (E310) 0,163 mg/ml

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ): Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ: Κρέας και εδώδιμοι ιστοί 21 ημέρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Για ενδομυϊκή χρήση. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης, πριν από τη χρήση.

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Huvepharma NV • Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerpen • Βέλγιο
Τηλ: +32 3 288 1849 • Φαξ: + 32 3289 7845
E-mail: customerservice@huvepharma.com

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
nuevo s.a.
Λεωφόρος Στρατηγού Ν. Γλασπύρη
346 00 Νέα Αρτάκη-Εύβοια
Τηλ. 22210-40081 • Fax. 22210-40610

Μετά το πρώτο άνοιγμα, χρήση
έως 28 ημέρες.
Απορρίψτε τυχόν ποσότητα του
προϊόντος που παραμένει στη
συσκευασία μετά το παραπάνω
χρονικό διάστημα.
Μετά το πρώτο άνοιγμα, χρήση έως:

ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

6823/1-2-2010

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ): • Η εξ ατυχήματος έγχυση του προϊόντος είναι επικίνδυνη – βλ φύλλο οδηγιών χρήσεως, πριν από τη χρήση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: • Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C. Μην ψύχετε ή καταψύχετε. Φυλάσσετε προστατευμένο από το φως.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ:

• Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές απαιτήσεις.

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση- να διατίθεται μόνο με κτηνιατρική συνταγή.

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

ΛΗΞΗ μήνας/έτος

<Παρτίδα> <Μέρος> <Αριθ. παρτίδας> (αριθμός)

